



我国早在2000多年前就开始栽培魔芋了,食用历史也相当悠久,是有益的碱性食品。对食用动物性酸性食品过多的人,搭配吃魔芋可以达到酸碱平衡。魔芋还具有降血糖、降血脂、降血压、散毒、通脉、减肥、通便、养颜、开胃等功效。近年来,随着人们对魔芋作用与用途的认识,产品开发利用不断深入,刺激了魔芋产业的不断发展,种植规模逐年扩大,种植水平不断提高,生产效益不断显现,在一些地方已成为主导产业,也是乡村振兴的优势项目。

DONG ZHONG ZHI

# 魔芋高产栽培技术要点

■ 樊会章

魔芋的品种有很多,我国记载的就有30多种,药食兼用的魔芋有8种,具有开发研究价值的魔芋为花魔芋和白魔芋。其中白魔芋是魔芋家族中减肥性能最突出的一个品种,以白魔芋为原料的魔芋制品研发正悄然兴起。通江雪魔芋是巴中市通江县的特产,是天然的绿色食品,生产加工的魔芋粉品质好,色白、味美,深得人们的喜爱。现就通江雪魔芋的高产栽培技术介绍如下。

地区也可在11~12月播种,可减少种芋贮藏程序。播种前对贮藏过的种芋暴晒1~2天,提高发芽力,再用50%多菌灵可湿粉剂500倍或50%甲基托布津可湿粉剂500倍浸种30分钟,或用75%百菌清可湿粉剂与72%农用链霉素1500倍液浸种30分钟后晾干。在选好的地块上按180厘米开沟畦,畦面占140厘米,重施底肥,播种的深度大约是5厘米,播时在垄面上种3行魔芋,第一行距宽10厘米处挖沟,第二行距与第一行间距60厘米,第三行距与第二行60厘米,距畦边10厘米。或以垄中心播种第一行,第二、三行距中心行各60厘米。株(窝)距根据种芋大小确定在50~60厘米之间。窝深2厘米左右,在窝内每株施优质腐熟农家肥10千克左右,上盖土3厘米,然后放一个种芋再盖10厘米左右的土,于3月中旬育苗,4月初在沟两边各按株距28厘米移栽一行玉米遮阴。



魔芋

## 选种

选择芽窝较小、口平、顶芽粗壮,表面光滑无病、虫、伤疤,重量达50~200克的第二代优质种芋。

## 选地及轮作倒茬

魔芋喜温怕冷、喜阴怕晒,喜湿怕渍、喜肥怕瘦,喜酸怕碱,故应选择土层深厚肥沃、排水透气良好、PH值为6.5~7的沙壤土。魔芋怕连作,每两年轮作倒茬一次,魔芋间套种玉米,利用玉米茎秆伤腐的特点给魔芋遮光,防止强光灼伤魔芋茎叶,有利于魔芋生长。并坚持不与茄科作物套种,可减轻魔芋病害的发生率。

## 播种

在3月下旬至4月上中旬,或当地表10厘米土温连续日达10℃以上即可播种。850米以下低海拔

## 田间管理

覆盖管理。魔芋播种后要大力收集各种作物禾秆、角果壳、枯叶等覆盖物,严密地撒盖于魔芋地面,达到“草不成堆、土不露白”的标准,一般每亩需用覆盖物1000公斤左右。

## 追肥

合理追肥。魔芋的生长旺期在8月份左右,这时魔芋需肥量非常大。此时追肥要以钾肥为主,氮磷为辅,充足的钾肥可增强魔芋的生长能力,促进块茎膨大。要控制氮肥的施用,防止植株旺长。在魔芋的生育期内,至少要追肥两次,第一次在魔芋换头期的时候,第二次是膨大期,这两个时期都是魔芋生长的重要时期,要保证满足魔芋生

## 病虫害防治

病害防治。魔芋生育期应注意软腐病和白绢病的预防,软腐病可用低浓度波尔多液或用75%农用链霉素800倍液交替喷施2~3次;白绢病用甲基托布津、代森锰锌、甲霜灵预防。若发现病株,立即拔除,带土挖除深埋或烧毁,并在窝内及周围撒石灰,踩紧土壤,防止雨水带走病菌扩大传染。

## 适时采收

玉米采收。玉米从播种至成熟期在127天左右,比魔芋成熟期要早很长时间,采收时要保留玉米植株,继续为魔芋遮阴。

## 魔芋采收最佳时间是在魔芋植株倒苗后10天左右为宜

11月底至12月初,魔芋倒苗后10天左右,选择晴天采收,采收时要注意轻拿轻放,避免人为损伤。

(作者单位:巴中市巴州区植保植检站)

# 夏季养羊“七注意”

夏季气候炎热,高温高湿的环境极易造成羊中暑或发生其他疾病。因此,为提高养羊效益,需注意以下七点。

**注意羊只驱虫。**成羊或产后母羊,可用驱虫药驱除体内外寄生虫。用药方法:混匀在饲料中饲喂,隔7~10天后重复给药1次。初春生产的羔羊,在肝片吸虫病流行的地方,可用硝氯酚等,按药用说明进行驱虫。

**注意放牧方法。**夏季天气炎热,上午放牧应早出早归,一般待露水刚干即可出牧。中午11时至下午3时让羊在圈内休息吃草料,下午可在晚7时收牧。晴爽天气,应选择阴凉的地方放牧;热天要选择林阴地放牧,以防中暑。

**注意给盐给水。**在每天补喂1~2次混合饲料(麦麸、玉米面、豆饼等加精粗、草糠混合)的同时,每天放牧羊只要饮用4~6次淡盐水。切忌让羊饮用死塘水、排灌水、洼沟水或让羊在潮湿泥泞的地方吃草、休息,以免引起风湿病。

**注意风雨袭击。**夏季雷阵雨较多,羊群一旦遭袭击很容易伤体、感冒、掉膘,因此,夏天放牧应尽量避开风雨。多雷多雨天气,放牧时可自带能容纳羊群的大块纤维布,四角扣牢在大树上,即可让羊临时避雨。另外,切忌雷闪电雷鸣时在陡坡放牧,以防羊受惊吓摔伤。

**注意散热凉羊。**夏季,羊很容易上火发病。因此,为保证羊体健康,每天凉羊十分重要。羊经过长时间放牧,往往造成疲劳闷热,羊的胃很容易发酸。中午放牧后羊群不要急于赶入羊圈,可让羊在树荫下乘凉休息、饮水。晚上放牧后,待羊凉一段时间后再入圈舍。每次出牧和收牧时,不要急于赶羊,应让羊缓慢行走、活动、凉体散热。

**注意环境卫生。**夏季高温多湿,羊放牧归来后,活动范围变窄,容易造成圈舍的潮湿和环境不良,往往会引起寄生虫病的发生,因此要注意羊舍的环境卫生、通风和防潮,保持羊舍清洁干爽,做好羊疥癣等寄生虫病的防治。日常喂给的饲料、饮水必须保持清洁。不喂发霉、变质、有毒及夹杂异物的饲料。饲喂用具保持干净,并定期消毒。

**注意防病治病。**定期进行预防注射,注射时要逐只清点,做好查漏补注射工作。放牧时要随时注意羊的精神状态、食欲和粪便情况。要特别注意羔羊的疾病防治。一般羔羊生后36小时内应喷土霉素10毫克,每天2次,连服3天,可减少疾病的发生。及时注射口蹄疫、羊痘和四联疫苗(炭疽、快疫、羊痘、羊肠毒血症)。针对羔羊肺炎,静脉注射10%磺胺嘧啶钠5~10毫升,并加25%葡萄糖液20~30毫升。(郝萍)

本版图片来自网络,请图片作者与本报联系,以付稿酬。

# 遗失公告广告登报办理总汇

声明、公告、环评公示等 电话 13308064232, 13880605967, QQ: 2072683032

Table with multiple columns containing legal notices, company announcements, and public service information. Each entry includes a title, a brief description of the notice, and contact information.