

冬季农作物防寒减灾技术要点

农业百科

NONG YE BAI KE

大棚铺地膜,你做对了吗?

地膜覆盖在提高地温、保水保肥方面发挥了突出作用,大大提高了农作物抗击农业灾害的能力...

秋茬蔬菜地膜覆盖过早,不利于根系深扎。

进入冬季,随着气温的降低,种植黄瓜的菜农通常采用“打孔法”加紫膜覆盖地膜...

地膜紧贴茎基部,死棵严重。

菜农李师傅种植的甜椒发生大面积死棵现象,茎基部腐烂变黑褐色、水浸状...

提醒菜农朋友,地膜覆盖时切记不要紧贴蔬菜茎基部...

只有操作行覆盖地膜,等同于没有覆盖地膜。专家走访时还发现,不少菜农为了降低成本只覆盖棚内的操作行...

进入冬季,低温、冰雪、寒潮、冰雹、大风等极端气象性灾害极易对农作物造成影响...

于15℃时,开大棚两头门通风;当棚内气温在0℃~4℃时,小棚膜在中午揭1~3小时。

3.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

4.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

5.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

柑橘防寒减灾技术

1.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

2.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

3.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

4.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

5.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

茶叶防寒减灾技术

1.进行分类修剪。对无采摘的幼龄茶树,要按受冻程度分别采取不同的修剪方法...

2.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

3.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

4.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

5.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

一般可以不剪,让其自然发芽;受冻较重的,用整枝剪分别将受冻枝条在适当位置进行重修剪...

2.进行分类培管。当年秋季刚移栽的茶苗,因根系尚未完全恢复生长,极易被冻土整棵拱起...

3.追施速效肥。油菜遭受冻害侵袭后,叶片和根系均会受到不同程度的损伤...

4.及时防治病害。油菜受冻后,植株受损,易发生菌核病等病害,应及时喷施核净或咪唑胶等药剂进行防治。

5.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

6.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

7.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

8.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

9.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

10.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

11.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

12.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

13.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

14.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

15.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

16.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

17.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

18.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

19.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

20.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

21.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

22.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

23.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

24.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

25.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

26.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

27.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

28.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

29.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

30.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

31.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

32.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

33.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

34.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

时,一般都会出现较强烈的霜冻,这对幼苗损害极大。各地要在拱棚上加盖塑料或稻草防霜冻...

3.及时防治病害。茶苗受冻后,往往容易受病害侵袭,待晴天冰雪融尽后,要喷施一次波尔多液或多菌灵防治病害。

4.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

5.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

6.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

7.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

8.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

9.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

10.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

11.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

12.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

13.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

14.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

15.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

16.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

17.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

18.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

19.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

20.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

21.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

22.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

23.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

24.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

25.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

26.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

27.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

28.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

29.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

30.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

31.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

32.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

33.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

34.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

35.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

时,一般都会出现较强烈的霜冻,这对幼苗损害极大。各地要在拱棚上加盖塑料或稻草防霜冻...

3.及时防治病害。茶苗受冻后,往往容易受病害侵袭,待晴天冰雪融尽后,要喷施一次波尔多液或多菌灵防治病害。

4.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

5.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

6.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

7.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

8.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

9.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

10.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

11.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

12.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

13.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

14.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

15.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

16.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

17.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

18.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

19.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

20.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

21.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

22.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

23.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

24.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

25.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

26.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

27.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

28.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

29.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

30.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

31.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

32.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

33.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

34.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

35.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

时,一般都会出现较强烈的霜冻,这对幼苗损害极大。各地要在拱棚上加盖塑料或稻草防霜冻...

3.及时防治病害。茶苗受冻后,往往容易受病害侵袭,待晴天冰雪融尽后,要喷施一次波尔多液或多菌灵防治病害。

4.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

5.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

6.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

7.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

8.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

9.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

10.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

11.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

12.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

13.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

14.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

15.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

16.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

17.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

18.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

19.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

20.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

21.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

22.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

23.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

24.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

25.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

26.及时松土施肥。每株每次施尿素50~100克,7~10天施一次,连施3~5次...

27.及时救护冻裂枝干。树上积雪融落后,迅速对被撕裂的树干扶回原生部位...

28.据情熏烟覆盖。为防止雪上加霜,在骤晴早晨5~8时或夜晚,用桔枝、落叶、锯末屑...

29.适时分类修剪。在雪后7~10天冻伤枯死枝条易辨认时分类修剪,剪除枯死枝...

30.及时施肥促发春梢。冻害过后,要及时松土施肥,每株每次施尿素50~100克...

31.加强病虫害防治。柑桔冻害后,要高度重视树脂病、日灼病和潜叶蛾的防治...

32.当棚内气温高于5℃时,白天全天揭开小棚膜;当棚内气温高于15℃时,开大棚两头门通风...

33.当气温在0℃以下时,白天选择中午揭小棚膜30分钟至1小时,其余时间关闭小棚膜...

34.当气温低于0℃时,有条件的生产者可在小拱棚内架设空气加温线...

35.清除棚面积雪,大棚四周及时疏通排水,以防雪水渗入苗床。

四川科技报刊登分类信息公告 全心全意为您服务 电话:1388-028-1755 收费标准:55元/行/天...

成都高新区劳动人事争议仲裁委员会公告 成都高新区劳动人事争议仲裁委员会公告 成都高新区劳动人事争议仲裁委员会公告...

北京阳光国际拍卖有限公司拍卖公告 北京阳光国际拍卖有限公司拍卖公告 北京阳光国际拍卖有限公司拍卖公告...