

栏目协办:四川省抗癌协会
四川省肿瘤医院

社区风采

责编:代俊 美编:乌梅 2019年11月27日 星期三

“您,摔倒过没有?”
“不就是跌倒嘛,拍拍屁股站起来就是了,这点痛算什么!”

“我年轻,咋可能跌倒嘛。”

“我注意到看路,就不得跌倒了。”

……
以上这些都是错误的想法。特别是对于已住院的患者来说,跌倒的危害尤其大,不仅会影响身体健康,还可能延误治疗,甚至危及生命。跌倒是不容小觑的问题,一定要重视!

跌倒,是指不能控制的非故意的倒地,或倒在其他较低平面上的行为。我国每年约有4000万老人跌倒,是60岁以上人群发生伤害的头号原因,据研究5%~15%的跌倒会造成脑部损伤、软组织挫伤、骨折和脱臼等伤害。

◎什么样的人容易发生跌倒?

老年人?走路不稳的人?视力不好而看不清楚路的人?以上都对,但还不全面,医务工作者通常会使用专业的评估量表评估,比较常见的危险因素有以下8点:

- 1.年龄大于70岁。因为老年人的肢体协调能力较差,关节活动不够灵敏,易导致跌倒摔伤。
- 2.曾发生过跌倒的患者风险系数更高。
- 3.头晕。
- 4.感觉无力。
- 5.食欲差。
- 6.视力下降或听力下降。有研究显示,有听力、视力、肌力障碍的患者跌倒风险是无障碍患者的2.4倍。
- 7.尿频、腹泻。
- 8.用化疗药、降压药、降糖药、止痛药、安眠药。利尿药、麻醉镇静药物、抗高血压药物可能影响患者的神志、精神、视觉、步态、平衡、血压等,放化疗后患者多较虚弱,使用利尿剂后,增加了患者反复上下床如厕的几率,从而增加跌倒风险。

不容忽视的 跌倒



■ 何冰容 朱科第

施,避免用力排便引起头昏跌倒。

3.间夜跌倒约占69%。夜间灯光昏暗,容易影响视线,增加了跌倒的风险。

4.晨起约占13%。清晨也是患者易跌倒的时刻之一。

◎如何预防跌倒?

1.对于有跌倒风险的人员留陪护一名,随时贴身陪伴患者,特别是上厕所时。

2.规范放置物品,不要在房间内连接电线等绳状物,保持房间走道通畅,尤其是病房的陪伴椅一定要收起、病床的床尾摇柄要及时收好。

3.裤子和鞋要特别注意,请穿防滑鞋;裤脚不要太长或太大。

4.改变体位慢一点,床上坐起30秒,床边坐起30秒,床边站立30秒方可行走。

5.有人陪伴时才下床,不单独行

动,地面湿滑时不活动。

6.使用床挡,但是身体不要倚靠床挡。

7.活动时感觉不适要马上说出来,靠墙或就地坐下可以减少伤害程度。

◎跌倒发生时如何减轻伤害?

1.感到头晕无力时,顺势就地坐下,不勉强移动去寻找床和椅。

2.跌倒时别用手腕去支撑,易发生手臂骨折,尽量用双手保护头部。

3.跌倒后不要马上起身,最好等医护人员检查后再活动。如果当时没有其他人员在场,也要先感觉下身体的着地部位是否疼痛,轻轻试一下能否自如活动,如感到活动受限,有可能是发生了骨折,赶紧呼叫寻求帮助。

(作者单位:四川省肿瘤医院)

栏目 | 四川省民族科普服务中心
协办 | 甘孜州科协 阿坝州科协

心梗病人的健康管理

急性心肌梗死是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死。因为起病急而重,可瞬间猝死。在医院度过了急性期后,家庭的病情观察与健康管理对病人的预后和康复至关重要。那么,怎么进行心梗病人出院后的家庭护理和病情管理呢?

严格遵医用药。心梗患者一般需长期规律用药,病人和家属需了解所用药物的名称、剂量、作用及可能产生的副作用,并按时按量服用,切忌自行调整药量或停药。

定期监测心电。备台血压计,有不适时,及时测量血压和心率,必要时可备掌上心电监护仪。

建立病历档案。从初次发病资料到最近就诊资料有序保存,与诊疗卡、医保卡、门诊病历本等放置到一起,如果发病,及时送医,医生也更容易了解情况,尽快做出处置。

及时复诊随诊。根据医生嘱咐,定期复查血脂、血糖、血压、心肌酶、肝功能、血常规和凝血功能,以及心电图、心脏彩超、螺旋CT或冠脉造影等。积极治疗高血压、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症等。一旦出现不适,要及时就诊。

(钟康)

改善生活方式。摒弃不良嗜好,戒烟限酒少刺激、睡眠充足不熬夜,保持饮食平衡,食物清淡多纤维,多吃水果蔬菜。


保持良好情绪。正确对待自己的病情,积极应对疾病过程中出现的各种问题,保持良好的精神状态和和谐的家庭氛围,避免情绪激动,焦虑紧张。

规避诱发因素。切忌从事剧烈活动、暴饮暴食、吸烟酗酒。防止便秘,避免过度劳累,适时增减衣服。

掌握紧急自救知识。当出现胸痛、晕厥、大汗等症状时,病人



我国第一块肌肉干细胞培养肉面世



技术的突破、产品安全性等相关性能的评估,以及生产流通过程的监管等。

南京农业大学国家肉品质量安全控制工程技术研究中心透露,

11月21日,中国农学会组织专家对该成果进行技术评价,认为该成果有三个突破。一是首次分离得到了高纯度的猪肌肉干细胞和牛肌肉干细胞,突破了培养肉研究难以获得高纯度单一细胞群的瓶颈。二是创立了猪和牛肌肉干细胞体外培养干性维持方法,初步解决了传代过程中细胞增殖和分化能力衰减的难题。三是研发出我国第一块肌肉干细胞培养肉产品,使我国跻身于该领域国际前列。

周光宏团队从2009年起开展用于培养肉的干细胞研究,在2015年~2017年间分离纯化出高纯度的猪肌肉干细胞和牛肌肉干细胞,研究出干细胞体外培养干性维持方法。(据《科技日报》)

护肾8要点

■ 冯芹

是在自毁肾脏。此外,有药物过敏史及肾病史者,在就医时要向医生及时说明。着重提醒,药物过敏后果很严重,一定要先对医生说清楚。

注意保暖防感冒。临床发现,天气较冷或气温变化明显的时节,新发肾病患者和病情加重者明显增多,这与温度改变会导致血管收缩,从而影响肾脏血流有关。

控制糖尿病和高血压。

糖尿病和高血压可致慢性肾病,而肾病又会加重糖尿病和高血压的病情。

所以,有糖尿病和高血压者,要注意控制病情,定期验尿。

不暴饮暴食。

暴饮暴食会加重肾脏负担,经常如此,有损肾脏,已有肾病者更应注意。

注意扁桃腺炎。扁桃体链球菌感染可引发急性肾炎,故扁桃体炎反复发作的患者,建议尽早手术根治。

不要憋尿。憋尿习惯很不利于肾

脏,因为尿液长时间滞留在膀胱,易产生细菌繁殖。大量的细菌通过膀胱、输尿管感染肾脏,引发肾盂肾炎。

远离重金属和毒物。铅、铬、汞等重金属,苯、甲苯、酚等有机溶剂

以及蛇毒、生鱼胆、毒蘑菇等生物毒

素,均会严重损害肾脏,要避免接触

这些物质。若工作原因不可避免,请

一定做好防护。

重视治疗泌尿结石。有些泌尿

系统结石患者以为疼痛不再发作,

就是痊愈了,进而终止诊疗,其实这

样做很危险。泌尿系统结石尤其是输尿管部位结石容易造成肾积水,日积月累,会形成梗阻性肾病,重者会出现肾功能衰竭或尿毒症。

远离重金属和毒物。铅、铬、汞

等重金属,苯、甲苯、酚等有机溶剂

以及蛇毒、生鱼胆、毒蘑菇等生物毒

素,均会严重损害肾脏,要避免接触

这些物质。若工作原因不可避免,请

一定做好防护。

作者单位:四川省泌尿外科医院



栏目协办:
四川省医学学会泌尿外科专委会
四川省泌尿外科医院

长宁县扎实开展防邪反邪大走访活动



本报讯为切实提升人民群众防邪反邪意识和能力,推动“平安长宁”建设,近日,宜宾市长宁县各镇组织开展了防邪反邪大走访活动。各镇抽调综治中心、民政办、司法所工作人员,以及派出所民警、网格员、村(社区)常职干部共计1500余人组成工作队,分组到村入户开展走访活动。

此次走访活动以“防邪反邪人人参与 平安长宁共同建设”为宣传主题,结合全县平时在防邪反邪宣传工作中的成熟经验和有效做法,将防邪反邪知识以广大群众喜闻乐见的方式进行宣传,确保宣传能够在全县群众中深入人心。

(吴德娜)

注销公告

内江市中新挚诚贸易咨询服务有限公司(注册号:511002000026164)经股东决定注销,请相关债权债务人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报相关债权债务事宜。逾期按相关规定处理。特此公告。

联系人:陈龙 电话:13340704503

2019年11月27日

遗失声明

广元万达广场商业管理有限公司2018年5月21日开具给成都乐微服饰有限公司的收据(编号:0000186,单据金额:24051.40元)和广元万达广场投资有限公司2018年8月13日开具给成都乐微服饰有限公司的收据(编号:000211,单据金额:66424.80元)遗失,声明作废。

2019年11月27日

遗失声明

成都同彩包装制品有限公司(统一社会信用代码:91510107099717713C)营业执照正副本、公章(编号:5101075082306)、财务专用章(编号:5101075082307)遗失,特此声明。

2019年11月27日

本报图片来自网络,请图片作者与本报联系,以付稿酬。