




有研究显示,20%~30%的首发静脉血栓栓塞症(VTE)病例与肿瘤相关,其中接受化疗的患者占13%。血液淤滞、血管壁损伤和血液高凝是发生静脉血栓的主要原因。今天我们就来讲述静脉血栓栓塞症的相关知识。

# 静脉血栓栓塞症,别等“堵”了再治

■ 文彦

## 静脉血栓栓塞症(VTE)



出现深静脉血栓的症状时,患者应及时就医,明确诊断并进行治疗。气短、呼吸困难等不适症状,需要提供医生和家属的可能。请及时就医,必要时给予预防性抗凝、溶栓等治疗措施。一旦深静脉血栓形成,将危及患者生命。

早

到

或

者

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或