



胆管癌 (Cholangiocarcinoma), 是一种由胆管上皮细胞 (或呈现上皮细胞分化特征的细胞) 癌变所形成的癌症。胆管癌是一种罕见的腺癌。

## 胆管癌——罕见的腺癌

田浪

胆管癌主要的症状为肝功异常、黄疸、消瘦、全身瘙痒、发热、体重下降。此外, 患者的粪便颜色可能变浅, 那颜色发黑, 症状的严重程度取决于肿瘤在胆管中的位置, 位于肝外胆管者较可能发生癌变, 位于肝内胆管者则较常发生癌变, 但不常伴黄疸。

胆管癌主要的症状为肝功异常、黄疸、消瘦、全身瘙痒、发热、体重下降。此外, 患者的粪便颜色可能变浅, 那颜色发黑, 症状的严重程度取决于肿瘤在胆管中的位置, 位于肝外胆管者较可能发生癌变, 位于肝内胆管者则较常发生癌变, 但不常伴黄疸。

胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。

胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。

胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。

胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。

胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。胆管癌的诊断主要依靠影像学检查, 多数患者在诊断前常误诊为胆管炎、胆结石等。

## 前列腺术后尿失禁的治疗

刘芸峰

一般来说, 前列腺手术发生的尿失禁随着时间的推延逐渐恢复, 通常在术后 12 个月内可恢复至术前水平, 但仍有一部分患者发生永久性尿失禁。

目前对术后尿失禁的治疗主要依据控尿肌训练、电刺激、药物训练及 M 受体阻滞剂等。首先, 术前应告知患者术后可能出现尿失禁, 术前应告知患者术后可能出现尿失禁, 术前应告知患者术后可能出现尿失禁。

前列腺术后尿失禁有那些常用的治疗方法? 在术后最初的 6 个月内应积极进行训练, 训练是通过对患者有意识的控制排尿肌群训练为主的盆底肌肉训练, 训练是通过对患者有意识的控制排尿肌群训练为主的盆底肌肉训练。

前列腺术后尿失禁有那些常用的治疗方法? 在术后最初的 6 个月内应积极进行训练, 训练是通过对患者有意识的控制排尿肌群训练为主的盆底肌肉训练, 训练是通过对患者有意识的控制排尿肌群训练为主的盆底肌肉训练。

## 冠心病的日常护理

黄梅

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称, 是指发生粥样硬化时, 血管腔狭窄或阻塞, 引起心肌缺血缺氧坏死所引起的心脏病。冠心病多发于老年人, 大部分患者没有临床症状, 有临床症状者主要表现为胸闷、气短等。



## 夹江县 反邪教警示教育宣讲进社区



这向老年人发放了反邪教知识宣传手册 100 余份, 通过此次宣讲, 有效增强了老年人对邪教和非法宗教的认识。他们纷纷表示, “没有想邪教真像我们这么乱, 更没想到邪教危害这么大, 以后我们要自觉抵制邪教, 健康平安晚年。”

遗失公告  
武利行遗失身份证, 声明作废, 本人: 王勇 (身份证号: 131102198409130018) 联系电话: 13603040000 2020年11月4日