

近期,我省各地晴雨交织的天气,使空气保持高温高湿状态,“蒸桑拿”的感觉非常明显。此种天气情况下,畜禽容易中暑、掉肉、生病,养殖户需做好相应防范应对措施。

# 农业生产安全度夏——畜牧养殖篇

## 高温应对措施

**强化圈舍通风降温。**最大限度开启门窗,同步采取降低循环水源温度、强化机械通风等辅助措施,如采用地下水替换高温循环水,增加风机开启数量、延长运行时长,提升整体降温效果,确保畜禽养殖环境舒适。

**完善遮阳防晒设施。**检查并修补圈舍遮阳网、凉棚,确保有效遮阳。露天或半开放式养殖场必须搭建足够遮阴棚。

**保障充足清洁饮水。**增设饮水点位,确保24小时不间断供应清洁凉爽饮水。定期清洗水槽水线,防止生物膜形成和细菌滋生。

**加强热应激管理。**在高温期间要保持饲养管理相对稳定,尽量避免转栏、断奶和更换饲料等可能引起畜禽应激反应的操作。必要的群体管理(如疏散高密度饲养畜禽)应在早晚相对凉爽的时段执行,操作过程中要保持动作轻柔,减少不必要

必要的惊扰,最大程度降低管理活动对畜禽造成的不良影响。

## 降雨应对措施

**加固修缮生产设施。**全面检查并加固畜禽圈舍、大棚、仓库等,重点排查老旧和简易棚舍,严防坍塌。

**疏通场区排水系统。**清理、疏通养殖场内外排水沟渠,确保畅通无阻。低洼地带养殖场须提前备足沙袋、抽水泵等防汛物资,必要时提前筑堤挡水。

**排查电气安全隐患。**严格检查场内所有电路及发电机、配电设备和防雷接地装置,确保其安全有效。落实防漏电、防短路措施,必要时切断非必需电源。

**储备关键应急物资。**提前储备足量饲料、常用兽药疫苗(消毒剂、抗生素、抗应激药物)、应急设备(发电机、手电筒、应急灯)、备用饮水设备以及必要维修工具。

**保障饲料安全储存。**饲料须存放于



AI制图。

地势高、干燥、通风良好的仓库,垫高堆


门窗是否完好,以防漏水,雨后及时晾晒受潮饲料,霉变饲料坚决废弃、严禁



**懂·种植**  
DONG ZHONG ZHI

豆角是餐桌上的常见蔬菜,也是我国广泛栽培的大众化蔬菜之一,多地均有种植。  
种植豆角若想实现高产,打尖是关键。

## 豆角打尖的正确方法



AI制图。

**什么是豆角打尖?**打尖就是摘掉豆角藤蔓最顶端的部分,也就是去头部。豆角是草质藤本植物,具有蔓延生长的特点,若藤蔓生长速度过快,会吸收过多的养分。为了保证豆角主蔓养分充足,必须抑制藤蔓无休止地蔓延,这样可以延长豆角的采摘期,让豆角主蔓分叉处开更多花,结更多果,从而获得高产。

**打尖时间。**一般在当地气温下降到20℃前,或者藤蔓布满架面后及时打尖,可最大化延长结荚时间。打尖最好在晴天中午露水干了后进行,此时可利用紫外线消毒,促使伤口加快愈合,减少病害传染机会。

**苗期打尖。**主蔓打尖应在藤蔓生长到1.5~2米时进行;侧枝打尖以第一花序为节点,花序下面的侧枝需

全部清除,花序上面的侧枝则保留,这样可让上部侧枝继续生长,促进通风透气,防止病害。

**主枝打尖。**主枝打尖可在藤蔓长到1米左右时开始,保留7~8个侧枝生长节点。打尖过早,侧枝数量会减少;打尖过晚,侧枝节点过多,长出的侧枝会过于密集。主枝的每个叶腋会萌发一个侧枝,侧枝一般能长出花蕾,管理时需将主枝60厘米以下的侧枝全部打掉。

**侧枝打尖。**侧枝数量通常较多,若按主枝打尖方法处理,效果不佳。可保留短侧枝:在侧枝修剪时保留第三个叶腋,在第三个叶腋处留1片叶后打尖,这样既能为伤口遮挡阳光,又能促进光合作用。

(据四川农村信息网)

**遗失公告:**李云霞遗失医师资格证书,证号:2024511415101241949802140182,声明作废。

**▲四川碧润信息科技有限公司(统一社会信用代码:91510000232688674)遗失法人章(唐红平)一枚,财务专用章一枚,公章一枚。声明作废。**

**注销公告:**刘晓燕不慎遗失护士执业证书,证书编号:201501068177,声明作废。

**▲成都华安光电技术有限公司(统一社会信用代码:915101070055299)遗失,声明作废。**

**▲四川碧润信息科技有限公司(统一社会信用代码:91510000232688674)遗失法人章(唐红平)一枚,财务专用章一枚,公章一枚。声明作废。**

**▲成都华安光电技术有限公司(统一社会信用代码:915101070055299)遗失,声明作废。**

**▲成都华安光电技术有限公司(统一社会信用代码**