

鼻胃管

长期卧床患者治疗后期可能会出现口咽疼痛、吞咽困难、进食呛咳等不良反应,可能导致患者不能经口进食或者进食减少,从而出现营养不良,甚至影响治疗的正常进行。此时,为了维持患者机体营养,通常需要安置鼻胃管,为患者建立一条“生命通道”。

泌尿知识角

附睾炎久拖不治危害大

上期我们讲了附睾炎的症状和预防,今天我们来看看附睾炎的治疗与预防的方法。

1.急性附睾炎的护理及治疗

急性附睾炎一般起病急,症状重,常伴有阴囊疼痛、肿胀、发热等。治疗以抗感染为主,同时注意休息,避免剧烈运动。

2.慢性附睾炎的护理及治疗

慢性附睾炎病程长,症状轻,常表现为阴囊坠胀、疼痛等。治疗以对症治疗为主,同时注意个人卫生,避免久坐。

3.附睾炎的预防

预防附睾炎的关键是保持良好的生活习惯,注意个人卫生,避免不洁性生活,及时治疗泌尿系统感染。

进食困难患者的“生命通道”

李亦健 杨雨蒙



会感到恶心,甚至呕吐,这时需要立即停止,并检查鼻胃管是否堵塞或移位。护理人员应密切观察患者的生命体征,及时发现异常情况。

每次喂饲的量不超过200毫升,间隔时间不少于2小时,温度在38-40摄氏度左右。护理人员应做好口腔护理,保持患者口腔清洁。

关于颅内压,你应该知道的知识

郑天国

颅内压又称脑压,是指颅腔内的内容物(脑组织、脑脊液、血液等)对颅腔壁所产生的压力。颅内压随着人的呼吸会有10毫米水柱上下的波动。

1.颅内压高

正常情况下,脑组织体积与颅腔容积保持平衡。当脑组织体积增大,或颅腔容积减小,就会导致颅内压增高。常见原因包括脑肿瘤、脑出血、脑积水等。

颅内压增高会导致头痛、呕吐、视乳头水肿等症状。严重时会引起脑疝,危及生命。治疗应以降低颅内压为主。

2.颅内压低

颅内压过低会导致脑组织移位,引起头痛、头晕、恶心等症状。常见原因包括脱水、营养不良、长时间卧床等。


治疗应以补充液体、纠正电解质紊乱为主。护理人员应密切观察患者的生命体征,及时发现异常情况。

珙县召开反邪教工作部署暨警示教育宣讲会

珙县县委政法委近日召开反邪教工作部署暨警示教育宣讲会,会上通报了近期反邪教工作进展情况,并对下一步工作进行了部署。

科技前沿

黑洞多波段“指纹”被成功捕获



通过事件视界望远镜(EHT)于2017年4月对M87星系中心超大质量黑洞的观测,科学家们成功捕获了黑洞的多波段“指纹”。

Advertisement for 'Changshang Science' (崇尚科学) and 'Oppose Superstition' (反对邪教). It includes a QR code and contact information.