

## 宫颈癌放疗前注意事项



高海燕

今天我们来谈谈宫颈癌放疗前的注意事项。

### 1. 心理护理

大部分患者确诊宫颈癌都会有紧张、恐惧、焦虑、自卑、抑郁等负面情绪，尤其是年轻患者表现更为明显。医护人员应及时发现，并给予心理疏导，帮助患者树立战胜疾病的信心。

### 2. 加强营养

患者常因治疗副作用影响食欲，导致营养不良。应鼓励患者多进食高蛋白、高热量、易消化的食物，如鸡蛋、牛奶、瘦肉、鱼、豆制品等。

### 3. 体外照射的护理

治疗前应每日清洗外阴，保持外阴清洁。每次放疗前应检查照射野皮肤有无破损、红肿、破溃等。

治疗期间应避免性生活，保持外阴干燥。穿宽松、柔软、透气的棉质内衣，避免摩擦。

治疗期间应避免剧烈运动，保持充足休息。如有不适，及时告知医护人员。

治疗期间应定期复查，监测病情变化。如有异常，及时就医。

治疗期间应保持心情舒畅，积极配合治疗。如有疑问，及时咨询医护人员。

放疗前应注意的事项如下：

1. 保持外阴清洁，每日清洗2-3次，保持外阴干燥。

2. 穿宽松、柔软、透气的棉质内衣，避免摩擦。

3. 避免性生活，保持外阴干燥。

4. 保持充足休息，避免剧烈运动。

5. 如有不适，及时告知医护人员。

6. 治疗期间应定期复查，监测病情变化。

7. 保持心情舒畅，积极配合治疗。

8. 如有疑问，及时咨询医护人员。

9. 治疗期间应保持外阴清洁。

10. 治疗期间应避免剧烈运动。

## 前列腺术后尿失禁的功能训练

刘芸楠

前列腺术后尿失禁的功能训练非常重要。在术后最初的6个月内，患者应进行盆底肌训练，以增强盆底肌肉的力量，从而改善尿失禁的症状。

训练方法包括：收缩盆底肌肉，保持5-10秒，然后放松。每天进行多次训练，每次10-15分钟。

此外，患者还应避免辛辣刺激性食物，保持大便通畅，避免便秘。

如果患者出现尿失禁症状，应及时就医，接受专业治疗。

训练期间应保持心情舒畅，积极配合治疗。

如有疑问，及时咨询医护人员。

1. 收缩盆底肌肉，保持5-10秒，然后放松。

2. 每天进行多次训练，每次10-15分钟。

3. 避免辛辣刺激性食物，保持大便通畅。

4. 如果出现尿失禁症状，应及时就医。

5. 保持心情舒畅，积极配合治疗。

6. 如有疑问，及时咨询医护人员。

7. 训练期间应保持外阴清洁。

8. 训练期间应避免剧烈运动。

9. 训练期间应保持心情舒畅。

10. 训练期间应积极配合治疗。

11. 训练期间如有疑问，及时咨询医护人员。

12. 训练期间应保持外阴清洁。

13. 训练期间应避免剧烈运动。

14. 训练期间应保持心情舒畅。

15. 训练期间应积极配合治疗。

16. 训练期间如有疑问，及时咨询医护人员。

17. 训练期间应保持外阴清洁。


18. 训练期间应避免剧烈运动。

19. 训练期间应保持心情舒畅。

20. 训练期间应积极配合治疗。

## 科学认识“三叉神经痛”

邓天国



三叉神经位于人脸的两侧，左右各一套。由耳上部的脑干部位发出，由眼神经分支、上颌神经分支、下颌神经分支构成。外观呈三叉样，故名三叉神经。是混合性神经。

### 三叉神经痛的原因

三叉神经的周围有许多血管和神经纤维。如果这些纤维受到刺激，就会导致三叉神经痛。常见原因包括：血管压迫、肿瘤压迫、炎症、外伤、高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

三叉神经，多发性硬化、神经压迫、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

三叉神经痛的高危人群：高龄、高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

三叉神经痛的临床症状：阵发性、短暂性、反复发作的剧烈疼痛，常由面部触发点诱发。疼痛部位在上颌、下颌或面部。疼痛性质为电击样、刀割样、针刺样、烧灼样、撕裂样、针刺样、刀割样、针刺样、烧灼样、撕裂样。

三叉神经痛的诊断：根据病史、临床症状、体格检查、影像学检查、神经电生理检查、神经活检等。体格检查：面部感觉减退、角膜反射减弱、咀嚼肌萎缩等。

三叉神经痛的鉴别诊断：原发性三叉神经痛、继发性三叉神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

三叉神经痛的预防：保持心情舒畅、避免劳累、避免受凉、避免潮湿、避免外伤、避免高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

三叉神经痛的诊断：根据病史、临床症状、体格检查、影像学检查、神经电生理检查、神经活检等。

### 三叉神经痛的预防

保持心情舒畅、避免劳累、避免受凉、避免潮湿、避免外伤、避免高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免受凉、避免潮湿、避免外伤、避免高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免潮湿、避免外伤、避免高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免外伤、避免高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免糖尿病、高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免高血脂、动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免动脉硬化、颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

避免颈椎病、腰椎病、坐骨神经痛、带状疱疹、多发性神经炎、神经纤维瘤、听神经瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤、淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤、转移性肿瘤。

## 长宁县防范邪教系列活动成效显著



长宁县防范邪教系列活动成效显著。通过开展系列宣传活动，提高了群众的防范意识，有效遏制了邪教的蔓延。

活动形式多样，包括发放宣传资料、举办讲座、开展入户宣传等。群众参与度较高，防范意识明显增强。

下一步，将继续加大宣传力度，创新宣传方式，确保邪教防范工作取得实效。

长宁县防范邪教系列活动成效显著。通过开展系列宣传活动，提高了群众的防范意识，有效遏制了邪教的蔓延。

活动形式多样，包括发放宣传资料、举办讲座、开展入户宣传等。群众参与度较高，防范意识明显增强。

下一步，将继续加大宣传力度，创新宣传方式，确保邪教防范工作取得实效。

通过开展系列宣传活动，提高了群众的防范意识，有效遏制了邪教的蔓延。

活动形式多样，包括发放宣传资料、举办讲座、开展入户宣传等。群众参与度较高，防范意识明显增强。

下一步，将继续加大宣传力度，创新宣传方式，确保邪教防范工作取得实效。

长宁县防范邪教系列活动成效显著。通过开展系列宣传活动，提高了群众的防范意识，有效遏制了邪教的蔓延。

活动形式多样，包括发放宣传资料、举办讲座、开展入户宣传等。群众参与度较高，防范意识明显增强。

下一步，将继续加大宣传力度，创新宣传方式，确保邪教防范工作取得实效。

长宁县防范邪教系列活动成效显著。通过开展系列宣传活动，提高了群众的防范意识，有效遏制了邪教的蔓延。

活动形式多样，包括发放宣传资料、举办讲座、开展入户宣传等。群众参与度较高，防范意识明显增强。

下一步，将继续加大宣传力度，创新宣传方式，确保邪教防范工作取得实效。