



## 正确应对

# 靶向药物引起的皮疹

文彦

临床上用的大多数靶向药物是一种特异性的分子靶向药物,被称为表皮生长因子受体抑制剂(EGFRs)。表皮生长因子(EGFR)在表皮内发挥着重要作用,能促进表皮细胞生长、抑制分化、保护细胞抵抗紫外线损伤、抑制炎症并加速伤口愈合。但不止肿瘤细胞表面有表皮生长因子,正常皮肤上也有。当用了靶向药物后,不仅肿瘤细胞停止了生长了,连正常皮肤细胞也停止了生长,直接影响皮肤的其他正常功能。所以目前认为,皮肤的角质形成细胞是靶向药物皮肤不良反应发生的主要靶点。靶向药物通过竞争性抑制ATP与受体胞浆区的结合,降低了磷酸化和激酶的活性,影响角质化细胞的增生、分化、迁移以及粘附,从而导致丘疹脓疱的形成及干燥症的发生。

大部分靶向药都有可能发生皮疹。痤疮样皮疹是靶向药物常见的副作用之一,其中特罗凯(厄洛替尼)、易瑞沙(吉非替尼)、凯美纳(埃克替尼)、克唑替尼等药物引发皮疹的发生率较高。肺靶向药物对皮肤的毒性较为明显,常出现痤疮样皮疹、瘙痒、甲沟炎、皮肤皲裂、溃烂、手足综合

征等。大多患者吃靶向药10天开始出皮疹,刚开始是发红,然后有的起包、带白尖,洗脸时可能白尖破裂出血,随后表现为全身皮肤粘膜广泛的药物性滤泡疹。由于靶向药物不同,皮疹分布也不一样。如口服易瑞沙的患者,皮疹主要集中在脸部;口服特罗凯的患者,首次服用后,皮疹往往首先大片出现于背部,约10天左右皮疹最严重。靶向治疗引起的皮疹,往往看着吓人,但它没有传染性,一段时间或者停药后会自行消退。

### 如何预防和处理皮疹?

- 1.正确服用靶向药物。餐前1小时或者餐后2小时服用,可预防皮疹。
- 2.常规皮肤预防。建议患者减少日晒时间,注意避光;每天保持皮肤清洁及干燥部位皮肤湿润,勿接触碱性和刺激性强的洗剂用品;沐浴后涂温和的润肤露或霜剂、维生素E软膏等预防皮肤干燥。
- 3.药物预防。从使用靶向药物第一天开始,遵医嘱使用预防皮疹药物,严重者可由主管医生判定,进行靶向药物剂量调整或者暂停用药。
- 4.皮疹处理。肺靶向药物引起

的皮疹,分为轻度、中度和重度。轻度皮疹对生活影响不大,不需特别处理,以观察为主。但重度皮疹对病人的生活质量影响很大,需要积极配合医生处理。

### 皮疹护理需注意些什么?

- 1.患者切勿用手抓挠皮疹处,避免引起感染。
- 2.患者要做好避光,出门带帽子、涂防晒霜,做好皮疹处的防晒。
- 3.用清水清洗皮疹处,不要用肥皂、沐浴露等刺激性洗浴产品;不要用力搓洗;洗澡也不宜太勤,夏季1~2天/次,冬季3~4天/次。
- 4.保持皮肤湿润,在面部及身体涂抹保湿乳液。
- 5.少吃海鲜等易过敏的食物。
- 6.同时使用其它药物时,注意观察药物之间是否会相互作用,避免皮疹加重。
- 7.出现皮肤异常紧急情况时,请及时联系医生。

(作者系四川省肿瘤医院胸部肿瘤内科护士长)

靶向药物挽救了许多肿瘤患者的生命,同时也让很多患者因为严重皮疹而痛苦不堪。有传言说“皮肤毒性反应严重程度与靶向治疗效果有关系,皮肤不良反应越重,靶向治疗效果越好”,真的是这样吗?



四川省医学会泌尿外科学分会  
四川泌尿外科医院

# 生理性尿频与病理性尿频有何不同?

陈玲

正常情况下,人们日间平均排尿4~6次,夜间就寝后0~1次。如果排尿次数明显增多,超过上述范围就可以视为尿频。尿频分为生理性和病理性。

生理性尿频指尿量增加时,排尿次数会相应增多。当大量饮水、吃西瓜、喝啤酒或冬季寒冷时,由于水分摄入量增加或天气寒冷,人体通过肾脏的调节作用会使尿量增多,排尿次数亦增多,便出现尿频。

病理性尿频是指某些引起尿频的疾病,如膀胱黏膜水肿、炎症浸润等,刺激膀胱而致尿频。患结核性膀胱炎时可发生膀胱挛缩,膀胱容量缩小,尿频持续存在,甚至出现尿失禁。还有一些非炎症刺激,如尿路结石、异物等,通常以尿频为主要表现。另外,某些排尿功能障碍,如前列腺增生,或者膀胱容量减少(如膀胱占位性病变或较大的膀胱结石等),都会使膀胱残余尿量增加而出现尿频。

如何区分生理性尿频和病

理性尿频呢?生理性尿频通常仅表现为一次性小便次数增多,不伴疼痛,几天后转为正常。而病理性尿频通常持续时间长,往往还伴有尿急、尿痛,有时还有发热等其他症状,需要赶快就医。另外,观察尿量也是一个简单的方法,生理性尿频每次排尿量都趋近于正常,而病理性尿频则有明显的尿量减少。

如果出现尿频,应该首先控制好饮水量。补充足够的水分对身体健康有益,但是并非饮水量越多越好。当饮水量增加时,尿液排泄量、排泄次数也会增多,出现尿频的可能性也会增高。在饮食上,可补充一些含钾丰富的食物,如香菇、白菜、豆类、花生、核桃、西瓜、香蕉等。

尿频还和精神方面的因素有关,有些人因为工作压力或学习压力而紧张和焦虑,可能会出现明显尿频。建议消除不良情绪,平时生活中要保持平和的心态,调节好个人情绪和压力。

(作者单位:四川泌尿外科医院)

### 科普零距离

栏目 | 四川省民族科普服务中心  
协办 | 凉山州科协

# 儿童哮喘须重视

杨书琴

哮喘是一种异质性疾病,常以慢性气道炎症为特征,表现为反复发作的喘息、呼吸困难、胸闷或咳嗽等。近年来哮喘患病率在世界范围内呈上升趋势,尤其是儿童哮喘的患病率在不断上升。哮喘的发作与遗传、免疫、精神、神经和内分泌因素有关,儿童哮喘的治疗可以分为避开过敏原、药物治疗、脱敏治疗及长期管理四个部分。

### 1.避开过敏原——从源头防治

诱发哮喘的过敏原有尘螨、花粉、霉菌、动物皮毛等,气候温度、物理化学刺激、特定的气味等也是导致哮喘发作的重要因素。因此,哮喘患者需先确定其过敏原,然后尽量避开。检测过敏原可采用皮肤点刺试验和血清特异性IgE。

### 2.药物治疗——控制发作

药物治疗分为控制药物和缓解药物两大类。控制药物是指需要每天坚持并长时间服用的药物,主要通过抗炎作用使哮喘维持临床控制状态,包括吸入性糖皮质激素、白三烯调节剂、长效β<sub>2</sub>-受体激动剂、缓释茶碱等。缓解类药物又称急救药物,在哮喘急性发作时按需使用,包括速效吸入和口服β<sub>2</sub>-受体激动剂、口服或静脉用激素、吸入性抗胆碱能药物等。

长期药物治疗往往采取“阶梯治疗”策略。控制药物和缓解药物适用于所有哮喘病人。有些患儿病情较轻可不用长期使用控制药物,发作比较频繁或病情比较重的患儿,就需要长期使用药物治疗。哮喘的阶梯治疗是目前哮喘的治疗策略,分为5级,1级适用于最轻患者,需要用最少的药物种类和剂量治疗,5级症状适用于最严重的哮喘患者,一般需要几种药物联合使用,医生还需要根据患儿的病情变化及时调整治疗方案。

哮喘患儿一定要随身携带支气管舒张剂。哮喘患儿一定要随身携带支气管舒张剂,在哮喘急性发作时紧急使用。使用一剂(1~2喷)症状未缓解,可半小时后再喷一剂。如果多次使用后症状缓解不明显,需及时就医。

哮喘控制效果不佳时可采取雾化治疗方法。哮喘急性发作时,可以给予雾化治疗,效果会更好。

### 3.脱敏治疗——根治过敏

脱敏治疗是指在确定患者过敏原后,使用由该过敏原制成的药物,按照剂量由小到大递增给药,通过使患者反复接触过敏原,提高患者对过敏原的耐受性,从而减少或减轻过敏症状的发生。脱敏治疗是目前唯一可彻底治疗哮喘的方法。根据给药方式不同,临床常见的脱敏治疗分为注射脱敏、舌下含服脱敏等。脱敏治疗的时间一般要三年左右。目前多数医院开展的脱敏治疗只适用于尘螨过敏患者。

### 4.长期管理——预后保障

儿童哮喘的预后效果,很大程度上取决于是否对患儿长期管理。为保证有效的长期管理,患儿家长一定要正确认识哮喘,了解哮喘发病情况,避免孩子接触过敏原,为孩子增加体育锻炼,改善其自身体质。关于哮喘的长期管理,请注意以下两点:

哮喘症状缓解后应定期进行肺功能检查。支气管哮喘是一种可逆的气流受限症状,表现为肺通气功能受损后,经过治疗或孩子症状自行缓解后,肺功能可恢复正常。如果孩子哮喘发作比较严重,肺功能可能就会严重损伤,因此哮喘儿童应定期进行肺功能检查。

哮喘不发作也需到医院做综合评估。哮喘没发作时也存在潜在高风险,要带孩子去医院综合评估,判断是否需要长期药物控制。

(作者单位:广安职业技术学院)

# 青羊区反邪教协会成立



栏目协办:四川省反邪教协会办公室

本报讯 5月22日,成都市青羊区反邪教协会成立大会在青羊区举行。四川省反邪教协会、成都市委政法委、青羊区委政法委、青羊区各街道相关负责人及相关社团人员共计80余人参会。

会上,青羊区委常委、政法委书记发表讲话。他指出,反邪教协会的成立标志着青羊区群众性反邪教斗争工作有了正式组织,也为全区反邪教工作注入了新的力量,协会要牢记自身肩负的职责使命,以此为新起点,不断推动全区反邪教工作向纵深发展。他要求,要提高思想认识,牢牢把握正确方向;要明确职责定位,充分发挥协会的独特作用;要加强自身建设,不断开创新局面;要勇于创新、积极探索、大胆工作,团结动员全社会反邪教人士,彻底铲除邪教组织滋生的土壤,全力维护政治安定、社会稳定,以优异成绩为青羊区经济社会高质量发展作出更大贡献。

会议宣读了成都市青羊区行政审批局《关于同意成立成都市青羊区反邪教协会》成立登记的批复;宣布了成都市青羊区第一届反邪教协会理事会任职人员名单;进行了青羊区反邪教协会授牌仪式和四川省反邪教协会向青羊区反邪教协会捐赠工作经费仪式。

青羊区反邪教协会理事长表示,将积极发挥协会作用,使用好捐赠资金,使其发挥最大的社会效益,绝不辜负上级对青羊区反邪教工作的支持和厚望。

(省反邪教协会供稿)

本版图片来自网络,请图片作者与本报联系,以付稿酬。

遗失公告广告登报办理总汇 声明、公告、环评公示等 电话 86615747、13308064232,QQ:2072683032

<b>减资公告</b> 攀枝花明杰咨询服务服务有限公司(统一社会信用代码:9151040068990021R)经股东会决议,将本公司注册资本由500万元人民币减至300万元人民币。债权人自本公告见报之日起45日内,有权要求本公司清偿债务。特此公告。 联系人:袁大友,联系电话:18384870025。地址:攀枝花市东区临江江路。 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 安岳县东普运输有限公司(统一社会信用代码:91512021MAG2K479952)经股东会决议减少注册资本,由原来的300万元减少至50万元。请公司债权债务人在本公告见报之日起45日内前来办理相关手续,逾期按规定处理。特此公告。 安岳县东普运输有限公司 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 四川绿和建材有限公司(统一社会信用代码:91512021MAG2K479952)经股东会决议减少注册资本,由原来的500万元减少至100万元。请公司债权债务人在本公告见报之日起45日内前来办理相关手续,逾期按规定处理。特此公告。 四川绿和建材有限公司 2020年5月30日	<b>注销公告</b> 四川省绵阳市游仙区游仙街道办事处(统一社会信用代码:510702000000)经股东会决议决定减少注册资本,由人民币20000万元减少至5000万元。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司申报债权。特此公告。 绵阳市游仙区游仙街道办事处 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 成都鼎泰电力工程有限公司(统一社会信用代码:91510105MAG60DQJ9F)经股东会决议决定注销公司,请公司相关的债权债务人在本公告见报之日起45日内,向我公司申报债权。特此公告。 成都鼎泰电力工程有限公司 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 四川鼎泰电力工程有限公司(统一社会信用代码:91510105MAG60DQJ9F)经股东会决议决定注销公司,请公司相关的债权债务人在本公告见报之日起45日内,向我公司申报债权。特此公告。 四川鼎泰电力工程有限公司 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 雅安南城区汇众养殖专业合作社(统一社会信用代码:51110201MAG2K479952)经股东会决议决定减少注册资本,由人民币100万元减少至50万元。请相关债权债务人在本公告见报之日起45日内向公司申报债权。特此公告。 雅安南城区汇众养殖专业合作社 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 四川兴恒康商贸有限公司(统一社会信用代码:91511025MAG643XBN60)经股东会决议决定减少注册资本,由人民币1000万元减少至人民币100万元。请相关债权债务人在本公告见报之日起45日内向公司申报债权。特此公告。 四川兴恒康商贸有限公司 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 成都鼎泰电力工程有限公司(统一社会信用代码:91510105MAG60DQJ9F)经股东会决议决定减少注册资本,由人民币20000万元减少至5000万元。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司申报债权。特此公告。 成都鼎泰电力工程有限公司 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 成都鼎泰电力工程有限公司(统一社会信用代码:91510105MAG60DQJ9F)经股东会决议决定减少注册资本,由人民币20000万元减少至5000万元。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司申报债权。特此公告。 成都鼎泰电力工程有限公司 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 成都鼎泰电力工程有限公司(统一社会信用代码:91510105MAG60DQJ9F)经股东会决议决定减少注册资本,由人民币20000万元减少至5000万元。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司申报债权。特此公告。 成都鼎泰电力工程有限公司 2020年5月30日	<b>减资公告</b> 成都鼎泰电力工程有限公司(统一社会信用代码:91510105MAG60DQJ9F)经股东会决议决定减少注册资本,由人民币20000万元减少至5000万元。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司申报债权。特此公告。 成都鼎泰电力工程有限公司 2020年5月30日
--	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--